



## برنامه غذایی پیشنهادی به رشد گوجه فرنگی

میوه/درشت شدن میوه	قبل از گلدهی	پس از استقرار در خاک	آماده سازی زمین	زمان مصرف
				نوع کود مصرفی
			۱۰۰-۲۰۰ کیلوگرم در هکتار همراه کود دائمی	ماکروکامل زئوارگانیک
			۱۰۰-۲۰۰ کیلوگرم در هکتار همراه کود دائمی	میکروماس
۲ لیتر در هزار محلول پاشی				فروت ست/زینکابور /آمینوزینک
			۳۵-۴۵ کیلوگرم در هکتار آبیاری	نیتروکا
۲ لیتر در هزار محلول پاشی				آمینوکا
۱۵-۱۵ کیلوگرم در هکتار آبیاری	۱۵-۱۵ کیلوگرم در هکتار آبیاری			سولوپیتاس
	۱۵-۱۵ کیلوگرم در هکتار آبیاری			میکرومیکس (بودری)
۱-۲ لیتر در هزار محلول پاشی				فسفوکا/فسفوماس
		۱۵-۲۰ کیلوگرم در هکتار آبیاری		۲۰-۳۰-۲۰
			۱۰۰-۲۰۰ کیلوگرم در هکتار همراه کود دائمی	آلی گرانوله (۶-۳-۳)
۲-۳ لیتر در هزار محلول پاشی				های پتاس
		۲-۳ کیلوگرم در هزار محلول پاشی		سیوید ماس





## توصیه های لازم در استفاده از برنامه غذایی

- ✓ استفاده از هر نوع کود به هر میزان، فقط با توجه به آزمون خاک توصیه می شود زیرا کمبودها و بیش بودها با توصیه اصولی قابل رفع شدن هستند و استفاده بدون تشخیص صحیح می تواند باعث ایجاد مسمومیت و افزایش هزینه های کشاورز شوند.
- ✓ برنامه غذایی ارائه شده به صورت کلی بوده و توصیه می گردد در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، با کارشناسان بخش فنی شرکت به رشد کویر رفسنجان تماس حاصل فرمایید.
- ✓ مقادیر ذکر شده برای یک برنامه جامع تغذیه ای و برای برداشت حداکثر محصول در نظر گرفته شده است، اما در صورتی که حتی یک یا قسمتی از این برنامه اجرا شود یقیناً اثرات مطلوب نسبی را در بر خواهد داشت.
- ✓ محلول پاشی باید در هوای آرام انجام پذیرد. بهترین زمان محلول پاشی صبح زود یا بعد از ظهر است که رطوبت هوا به بالاترین میزان ممکن رسیده و از شدت نور خورشید نیز کاسته شده باشد.
- ✓ جهت جلوگیری از گیاه سوزی، از محلول پاشی در هنگام ظهر و هوای گرم اجتناب شود.
- ✓ جهت اختلاط کودها با یکدیگر حتماً با کارشناسان ما در ارتباط باشید و در صورت امکان تست اختلاط قبل از مصرف انجام شود.
- ✓ استفاده از کودهای تک عنصری در صورت وجود علائم کمبود عناصر آهن، روی و منگنز جهت رفع علائم کمبود این عناصر غذایی توصیه می شود.
- ✓ استفاده از ترکیباتی مانند فیکسر در تنظیم پی اچ محلول های غذایی و همچنین بهبود جذب عناصر غذایی می تواند مفید باشد.
- ✓ استفاده بیش از اندازه از کودهای نیتراته و جلبک های دریایی میتواند باعث تاخیر در گلدهی و کاهش کیفیت میوه شود.



۰۳۴-۳۴۲۶۹۶۸۹

رفسنجان، شهرک صنعتی



BehRoshd.ir

BehRoshd